



# Cupania vernalis Cambess.

## TAXONOMIA

Família Botânica: Sapindaceae  
Gênero: Cupania  
Nome popular: Camboatá

## ECOLOGIA

- *Estágio Sucessional*: Secundária Inicial
- *Síndrome de dispersão*: Zoocórica
- *Perenidade das folhas*: Semi-caducifólia
- *Crescimento*: Lento
- *Densidade de copa*: Média
- *Floração*: Outubro a novembro
- *Solo e ambientação*: Ocorre em diversos tipos solos. Tolerante terrenos alagados.

## UTILIDADES

- *Uso Madeireiro*: baixo valor comercial, usada na marcenaria, carpintaria, moirão de cerca, esteios, peças entalhadas, implementos agrícolas, tacos.
- *Apícola*: flores melíferas.
- *Extrativo*: tanino.
- *Comercialização de sementes*.

## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- *Norte*: PA, AM
- *Nordeste*: BA
- *Centro-oeste*: GO, DF
- *Sudeste*: RJ, ES, SP, MG
- *Sul*: PR, SC, RS
- *Bioma*: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado

Adaptado da Lista de Espécies da Flora do Brasil



## REFERÊNCIAS

- CARVALHO, P.E.R. **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo, PR: Embrapa Florestas, 2006. v.2, 627p.
- DAN, M. L.; BRAGA, J. M. A.; NASCIMENTO, M. T.; Estrutura da comunidade arbórea de fragmentos de floresta estacional semidecidual na bacia hidrográfica do rio São Domingos, Rio de Janeiro, Brasil. **Rodriguésia**. n.61, v.4, p.749-766. 2010.
- SILVA, A. C. da; BERG, E. V. D.; HIGUCHI, P.; OLIVEIRA-FILHO, A. T. de.; Comparação florística de florestas inundáveis das regiões Sudeste e Sul do Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**., V.30, n.2, p.257-269, abr.-jun. 2007.

